Stetig

Zufallsgrößen

X - stetige ZG

~~X~~ = $X = [a, b]$

$R = [0, 1]$

1) $0, a_1^1 a_2^1 a_3^1 \dots$ $a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$
 2) $0, a_1^2 a_2^2 a_3^2 \dots$
 3) $0, a_1^3 a_2^3 a_3^3 \dots$

$a_i \neq 5 \rightarrow z_i = 5$

$a_i = 5 \rightarrow z_i = 0$

$0, z_1 z_2 z_3 \dots$

ges: $P(X=a)$
 $P(X < a)$
 $P(X > a)$
 $P(a < X < b)$

$$(1) P(X=9) = 0$$

Distr. ZF: $\frac{1}{6}$

$P(X \geq 3) =$

$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

$$P(X > 3) = \int_3^{\infty} f(x) dx$$

$$P(X < 3) = \int_{-\infty}^3 f(x) dx$$

$$P(3 < X < 7) = \int_3^7 f(x) dx$$

$$P(X = 3) = \int_3^3 f(x) dx = \\ = F(3) - F(3) = 0$$

Sei X eine stetige ZG.
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung
von X wird beschrieben durch
die Dichtefunktion $f(x)$
oder die Verteilungsfunktion $F(x)$

Woher kommt die
Dichtefunktion?

aus einer Stichprobe

Z.B. Benzinverbrauch

Es gibt spezielle Typen von Dichtefunktionen, die man mit dem Histogramm vergleicht, um Parameter abzuschätzen.

Z.B. Lebensdauer

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot e^{-bx} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

Die Eigenschaften der

Dichtefunktionen :

$$(1) f(x) \geq 0$$

$$(2) P(X \in \mathbb{R}) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Def: Verteilungsfunktion

ist eine Funktion mit

$$F(x) = P(X \leq x) \quad \text{falls:}$$

$$(1) x \in X \Leftrightarrow F(x) \leq 1$$

$$0 \leq F(x)$$

(2) $F(x)$ ist ~~stetig~~ monoton wachsend

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

(4) $F(x)$ ist stetig

diskrete ZG $\longleftrightarrow$

stetige ZG

Wahrscheinlichkeits-
Verteilung

W-Vert
Dichtefun

X	...
P _i	...

f(x)

$$\begin{aligned}
 F(x) &= P(\bar{X} \leq x) = \\
 &= \sum_{i=1}^x P_i
 \end{aligned}$$

Verteilungs-
fun

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt = \\
 &= P(\bar{X} \leq x)
 \end{aligned}$$

Aufgabe 1

Bei der Herstellung von Wellen sind alle Wellen Ausschuss, die 1mm oder mehr vom Sollmaß von 100mm Länge abweichen. Die zufällig schwankende Länge X genüge einer symmetrischen Verteilung mit der Dichtefunktion

Berechnen Sie

- Berechnen Sie die Höhe h !
- Wie groß ist der Ausschussanteil? Skizzieren Sie ihn als Fläche unter der Dichte!
- In welchem Toleranz-Intervall $[100-c, 100+c]$ liegen 90% aller Wellen? Skizzieren Sie das Intervall als Fläche unter der Dichte!

Aufgabe 2

Die Verteilungsfunktion $F(x)$ der zufälligen Entladezeit X (in Stunden) eines Akkus vom Typs EC2100 hat folgende Gestalt:

$$\text{Sei } F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 1 \\ x-1 & \text{für } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{für } x \geq 2 \end{cases} \text{ die Verteilungsfunktion einer Zufallsgröße } X.$$

- Skizzieren Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$!
- Berechnen und skizzieren Sie die Dichtefunktion $f(x)$!
- Wieviel % aller Akkus des Typs EC2100 entladen sich nach mindestens 1,5h?
- Berechnen Sie die Entladezeit, die 50% aller Akkus überschreiten!
- Berechnen Sie die mittlere Entladezeit EX und den Median von X !
- Berechnen Sie die Varianz $\text{Var}(X)$!
- Berechnen Sie $P(1,1 < X < 1,7)$, $P(X > 1,1)$ und $P(X < 1,7 | X > 1,1)$ und stellen Sie diese Wahrscheinlichkeiten grafisch anhand der Dichtefunktion dar!

Verteilungsdichte: $f(x) = F'(x)$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(X \geq 1,5) &= 1 - F(1,5) = \\ &= 1 - (1,5 - 1) = 0,5 \\ &\quad \text{50\%} \end{aligned}$$

Parameter stetiger VerteilungenErwartungswert

$$EX = E(X)$$

diskret

$$EX = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i$$

stetig $+\infty$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

Varianz

diskret

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - EX)^2 p_i$$

stetig

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx \end{aligned}$$

Standardabweichung

$$S = \sqrt{\text{Var}}$$

Aufgabe 2e) Berechnen Sie die mittlere Entladezeit EX f) Berechnen Sie die Varianz $\text{Var}(X)$!

$$e) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_1^2 x \cdot 1 dx =$$

$$= \left. \frac{x^2}{2} \right|_1^2 = 1,5.$$

$$f) \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx =$$

$$= \int_1^2 (x - 1,5)^2 dx = \left. \frac{1}{3} (x - 1,5)^3 \right|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right] = \frac{1}{12}$$

$$s = \sqrt{1/12} = \frac{1}{2} \sqrt{1/3} \approx 0,29$$

Quantile stetiger Verteilungen

Def.: Sei X eine stetige Zufallsgröße mit der Verteilungsfunktion $F(x)$ und Verteilungsdichte $f(x)$.

Der Wert $x_\alpha \in X$, für den gilt: $F(x_\alpha) = \alpha$ bzw. $\int_{-\infty}^{x_\alpha} f(x)dx = P(X \leq x_\alpha) = \alpha$ heißt (*unteres*) α -Quantil.

Aufgabe 2

e) den Median von X !

$$f(x) = \frac{1}{2} \quad F(x) = \begin{cases} x-1, & x \in [1, 2] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \frac{1}{2} = x-1 \Rightarrow x = \underline{\underline{1,5}}$$

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot p_i$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

Aufgabe 3

Sei X die zufällige Dauer von Telefongesprächen und sei die Dichte von X

durch $f(x) = \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x}$ gegeben.

- a) Wie groß ist die mittlere Gesprächsdauer?
 b) Welche Zeit überschreiten 80 % der Gespräche nicht?
 c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die zufällige Gesprächsdauer > 10 min ist? (Wie groß ist der Anteil aller Gespräche, die länger als 10 min dauern?)

$$\begin{aligned} \text{(a) } EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \\ &= \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \frac{1}{5} \int_0^{\infty} x e^{-\frac{1}{5}x} dx \quad \text{⊖} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int x e^{-\frac{1}{5}x} dx &= -5x e^{-\frac{1}{5}x} + 5 \int e^{-\frac{1}{5}x} dx = \\ &= -5x e^{-\frac{1}{5}x} + 5 \left[-5 e^{-\frac{1}{5}x} \right] + C \\ &= -5x e^{-\frac{1}{5}x} - 25 e^{-\frac{1}{5}x} + C \end{aligned}$$

$u = x$
 $dx = du$
 $x' = 1$
 $e^{-\frac{1}{5}x} = v$
 $v' = -\frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x}$
 $v = -5 e^{-\frac{1}{5}x}$

$$\begin{aligned} \text{⊖} &= -e^{-\frac{1}{5}x} [x + 5] \Big|_0^{\infty} = \\ &= -x e^{-\frac{1}{5}x} \Big|_0^{\infty} - 5 e^{-\frac{1}{5}x} \Big|_0^{\infty} = \end{aligned}$$

$$= (0 - 0) - (0 - 5) = 5$$

$$\int_0^{x_{0,8}} f(x) dx = 0,8$$

$$\int_0^{x_{0,8}} \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x} dx = 0,8$$

$$-e^{-\frac{1}{5}x} \Big|_0^{x_{0,8}} = 0,8$$

$$-e^{-\frac{1}{5}x_{0,8}} + 1 = 0,8$$

$$e^{-\frac{1}{5}x_{0,8}} = 0,2$$

$$x_{0,8} = -5 \ln 0,2 = 8,047$$

80% der Gespräche dauern nicht länger als 8,047min

$$c) \quad P(X > 10) = \int_{10}^{\infty} f(x) dx$$

$$= 1 - P(X \leq 10) =$$

$$= 1 - \int_0^{10} \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}x} dx =$$

$$= 1 - \left(-e^{-\frac{1}{5}x} \Big|_0^{10} \right) =$$

$$= 1 + e^{-2} - 1 = e^{-2} = 0,14$$

Beweis: Verteilungsfunktion:

$$F(x) = 1 - e^{-\frac{1}{5}x}, \quad x > 0$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{5}x}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Eigenschaften von Erwartungswert und Varianz

X - stetig oder diskret

Erwartungswert

$$1) E(a \cdot X) = a \cdot EX$$

Bsp.1: Die zufällige Dauer eines Telefongesprächs ist wie in Aufgabe 3 verteilt. Innerhalb von 3 Stunden führt eine Person 5 Telefongespräche. Wie lange telefoniert sie im Mittel insgesamt?

$$2) \cancel{E} E(5 \cdot X) = 5 \cdot EX = 5 \cdot 5 \text{ min} = 25 \text{ min}$$

$$E(a) = a$$

$$3) E(X+Y) = EX + EY$$

Bsp.2: Ein Hamburger besteht aus einem Brötchen und einer Frikadelle. Das Brötchen ist durchschnittlich 5 cm dick und die Frikadelle 2 cm. Wie groß ist der Hamburger im Mittel?

$$E(X+Y) = EX + EY = 5 + 2 = 7 \text{ cm}$$

$$4) E(X \cdot Y) = EX \cdot EY \quad (\text{falls } X \text{ und } Y \text{ stoch. unabh.})$$

Seien X, Y diskret $X = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$
 $Y = \{b_1, \dots, b_l\}$

$$Z = X \cdot Y$$

$$Z = \{a_i \cdot b_j; i=1, \dots, k; j=1, \dots, l\}$$

$P(X=a_i) \cdot P(Y=b_j)$
 $P(X=a_i \wedge Y=b_j)$

$$EZ = E(X \cdot Y) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l a_i \cdot b_j \cdot P(a_i \cdot b_j) =$$

$$= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l a_i \cdot b_j \cdot P(X=a_i) \cdot P(Y=b_j) =$$

$$= \sum_{i=1}^k \left[a_i \cdot P(X=a_i) \cdot \left(\sum_{j=1}^l b_j \cdot P(Y=b_j) \right) \right] =$$

$$= \left(\sum_{j=1}^l b_j \cdot P(Y=b_j) \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^k a_i \cdot P(X=a_i) \right) =$$

$$= EX \cdot EY$$

Eigenschaften von Erwartungswert und Varianz

X - stetig oder diskret

Varianz $(\text{Var}(X) = E(X - EX)^2)$

$$1) \text{Var } X = E(X^2) - (EX)^2, \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx$$

$$2) \text{Var}(c) = 0$$

$$3) \text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$$

$$4) \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

$$5) \text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y)$$

Bsp. 1: X - Zuf. Gr: $EX = \mu$; $\text{Var}(X) = \sigma^2$

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma};$$

$$E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = E\left(\frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}\right) =$$

$$= E\left(\frac{1}{\sigma}X\right) + E\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}EX + \left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) =$$

$$= \frac{\mu}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma} = 0$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} \cdot \text{Var}(X) =$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

Def: Eine ZG Y mit $EX = 0$ und $\text{Var}(Y) = 1$ heißt Standardisierte ZG.

Die Transform: $X \longrightarrow \frac{X - EX}{\sqrt{\text{Var } X}}$

hilft Standardisierung (Standardisierungs-
-transformation) einer ZG X.

(affine Transf.) (Umkehrbar; wichtig!
↳ Tabelle)

Die Tschebyscheff-Ungleichung**Satz:** Es gilt:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } P(|X - EX| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \\ \text{b) } P(|X - EX| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \end{array} \right\} \forall \varepsilon > 0$$

Beispiel 34: Produktion von Schrauben ($\varnothing = 5\text{mm}$ ~~5mm~~)
 X – zufälliger Schraubendurchmesser

Es gilt: $EX = 5\text{mm}$ und $\text{Var } X = 0,0025 \text{ mm}^2$

Ausschuß: Jede Schraube, die um mehr als 0,12 mm vom ~~5~~ ^{EX} abweicht.

Ges.: Ausschußrate der Produktion

$$P(4,88 \leq X \leq 5,12) =$$

$$= P(|X - 5\text{mm}| \leq 0,12) =$$

$$= P(|X - EX| \leq 0,12)$$

$\varepsilon = 0,12$
T-Ungl.)

$$\left(1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}\right) = 1 - \frac{0,0025}{(0,12)^2} = 1 - \frac{0,0025}{0,0144}$$

$$= 0,826$$

↳ 82,6% haben $\varnothing \in [4,88; 5,12]$

⇒ 17,4% aller Schrauben sind "defekt".

Übungsaufgaben Skript S. 40, Nr. 1,2,3